

Fiche Variétale

# Poire Sanguinole

Moudon (VD) - CHE

N° d'inventaire : A1304037

N° PLCODE : 14-003-547

N° PUIACC : A0000025330

N° famille génétique : 581

## La variété en bref

### Historique :

**Critères discriminants :** Cette variété présente un fruit de petite à moyenne taille. Cette poire possède une saveur aromatique et douce. Le fruit devient blet sur l'arbre.

**Synonyme génétique:** Unique.

### Légende :

n.é. = non évalué

### Pour en savoir plus :

[www.pgradmin.ch](http://www.pgradmin.ch)


[www.retropomme.ch](http://www.retropomme.ch)

### Bibliographie

Inventaire réalisé par Corbaz, R. (Ass. Arboretum d'Aubonne)

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille	petite à moyenne
Poids (min)	42 [g]
Poids (max)	198 [g]
Hauteur (min)	46 [mm]
Hauteur (max)	81 [mm]
Diamètre (min)	41 [mm]
Diamètre (max)	69 [mm]
Forme	turbinée aplatie
Pierrosité	moyenne

*Les couleurs*

de fond	vert blanchâtre
de recouvrement importance	forte jusqu'à 3/4 du fruit
de recouvrement répartition	mouchetée
de recouvrement couleur	rouge

*Les Roussissures*

Position	sur tout le fruit
Intensité	faible à moyenne

*Les lenticelles*

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	petites

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	très faible
Astringence	très faible
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	moyenne
Texture de la chair	spongieuse
Épaisseur de la peau	moyenne à épaisse
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	n.é.






**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	moyenne à forte
Ramification	moyenne à forte
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	petite à moyenne
Maturité relative	précoce à moyenne

**Remarques :****Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Brève, consommation ou transformation dès la récolte.

**Utilisations traditionnelles & conseils :****Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

